

Center for Kliniske Retningslinjer

- Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

<p>Titel</p>	<p>Klinisk retningslinje for postoperativ pleje af cicatrise</p>
<p>Fokuserede spørgsmål</p>	<p>Fokuserede spørgsmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvilken evidens er der for at en cicatrise der 24 timer efter kirurgisk indgreb hos den voksne patient fremstår med sårrande som ligger tæt uden at gabe, siver eller bløder er mindre modtagelig for infektion end en cicatrise som gaber, siver eller bløder? 2. Hvilken evidens er der for at en cicatrise der ikke gaber, siver eller bløder er modtagelig for infektion i forhold til om den er dækket eller ikke dækket af bandage i forbindelse med brusebad?(vil gerne slette dette) 3. Hvilken evidens er der for om brusebad med en okklusiv (vandtæt) bandage giver nedsat infektionsrisiko i forhold til brusebad med en ikke-okklusiv bandage?
<p>Søgeord</p>	<p>Søgeord: Hud og slimhinder</p> <p>Andre søgeord: Cicatrise, Suturerede sår, operationssår, kirurgisksår, postoperativ sårpleje, sårstyrke, sårlukning, sårheling, sårforbinding/bandage, suturfjernelse, postoperativ badeprocedure, kosmetiske gener/ardannelse.</p>
<p>Formål</p>	<p>Formålet med denne kliniske retningslinje er at opstille evidensbaserede anbefalinger for pleje af cicatrise, badeanbefaling og bandagering af cicatrise hos den voksne patient, således at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operationssåret får optimale betingelser for heling • risiko for sårinfektion og andre komplikationer minimeres • patienter oplever at vi som sundhedspersonale her ensrettede informationer og vejledning
<p>Patientgruppe</p>	<p>Patientgruppe: Voksne med suturerede sår på huden.</p> <p>Retningslinjen omfatter ikke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cicatrise med adgang til hulrum • cicatrise på slimhinder • cicatrise med infektion, sivning, ruftur og gab • patienter med diabetes, atherosclerose, steroidbehandling eller

Center for **Kliniske Retningslinjer**

- Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

	anden årsag der hindre normal sårheling.
Målgruppe	Målgruppe Sundhedspersonale i primær og sekundær sundhedssektor, der varetager pleje og behandlingen af mennesker med suturerede sår.
Tidshorisont	Denne kliniske retningslinje forventes indsendt til godkendelse maj 2012.
Kontaktperson	<p>Gitte Harboe Klinisk udviklingssygeplejerske Dermato-allergologisk afdeling Gentofte Hospital gihar@geh.regionh.dk Telefon: 39777221</p> <p>Linda Christensen Klinisk udviklingsygeplejerske Intensiv afdeling Gentofte Hospital linch@geh.regionh.dk</p> <p>Susanne Langesø Hansen Klinisk vejleder Øre, næse, hals afdeling Rigshospitalet suhan@geh.regionh.dk</p> <p>Charlotte Bjørn Kvalitetskoordinator Øre, næse, hals afdeling Rigshospitalet chbjo@geh.regionh.dk</p>