

Titel

Vurdering af iatrogene abstinenser hos hospitalsindlagte præverbale børn over 1 måned gamle.

Fokuserede spørgsmål

Hvilke abstinensscoringsredskaber findes der i litteraturen evidens for til at vurdere iatrogene abstinenser hos hospitalsindlagte børn mellem 1 måned og 3 år, og er disse redskaber validerede til at vurdere iatrogene abstinenser hos populationen?

Indeksering

Hovedsøgeord: Smerter og sanseindtryk

Indeks søgeord: Abstinenser, abstinensvurdering, abstinensscoring, abstinensscreening, børn, småbørn, før-skole, PICU, opioidafvænning, sedation, sedering, analgesi

Formål

Formålet med den kliniske retningslinje er at opstille evidensbaserede anbefalinger til vurdering af abstinenser hos pædiatriske patienter mellem 1 måned og 3 år gamle med risiko for udvikling af iatrogene abstinenser, således at vurderingen kan bidrage til at højne tidlig identificering og behandling af abstinenssymptomer.

Patientgruppe

Pædiatriske patienter efter neonatalperioden, men i præverbal udviklingsfase, hvilket vil sige under 3 år gamle. Patienterne er i risiko for at udvikle abstinenser efter behandling med opioider og/eller benzodiazepiner i forbindelse med intensiv terapi.

Målgruppe

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

- CLEARINGHOUSE

Sundhedspersonale, der deltager i pleje og behandling af pædiatriske patienter i risiko for at udvikle abstinenser efter behandling med opioider og/eller benzodiazepiner

Tidshorisont

Den kliniske retningslinje forventes indsendt til godkendelse oktober 2014.

Kontaktperson

Camilla Wærling Riiser, sygeplejerske, MKS.

Neonataalklinikken ved Rigshospitalet, afsnit 5021.

Camilla.waerling.riiser@regionh.dk, tlf. 35459584