

Titel

Udmalkning af modermælk - for mødre til præmature og syge nyfødte børn, (der ønsker at amme eller give barnet modermælk)

Fokuserede spørgsmål

1)

Hvilken evidens er der for effekten af tidlig kontra sen opstart af udmalkning fremmer moderens mælkeproduktion med henblik på amning

2)

Hvilken evidens er der for effekten af udmalkning 6 eller flere gange i døgnet kontra mindre hyppigt fremmer moderens mælkeproduktion med henblik på amning?

3)

Findes der evidens for at andre faktorer har indflydelse på moderens mælkemængde?

Indeksering

Hovedsøgeord: Ernæring

Indeks

søgeord: Modermælk, udmalkning, brystpumpe, præmatur, neonatal

Formål

Formålet er at undersøge det optimale tidspunkt for opstart af udmalkning, og den optimale frekvens moderen bør malke ud med, samt hvilke andre faktorer der kan have positiv indflydelse på moderens mælkeproduktion med henblik på amning.

Patientgruppe

Mødre til nyfødte børn på neonatalafdeling, hvis barn/børn ikke kan die tilstrækkeligt til at dække sit/deres ernæringsbehov.

Målgruppe

Sygeplejersker og jordemødre på neonatalafdelinger/afsnit, føde- og barselafdelinger

Tidshorisont

Den kliniske retningslinje forventes indsendt til godkendelse juli 2015.

Kontaktperson

Ragnild Måstrup, forsker og klinisk sygeplejespecialist, Videnscenter for amning af børn med specielle behov, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Ragnild.maastrup@regionh.dk tlf.nr. 35 45 53 30.

UNDER UDARBEJDELSE