

Bilag 4

1 SfR Checkliste 5: Undersøgelser af diagnostiske tests	
Forfatter, titel: McLaren SMG. Dickerson JWT. Measurement of eating disability in an acute stroke population (EDAS)	
Tidsskrift, år: Clinical Effectiveness in Nursing 2000; 4:109-120	
Checkliste udfyldt af: AR, SC, YAH	
2 1. INTERN GYLDIGHED	
Evalueringskriterier	I hvor høj grad er kriteriet opfyldt?
2.1 Blev <i>testen</i> sammenlignet med en valid referencestandard ("Gold standard")?	Ja 2. Opfyldt i tilstrækkelig grad I mangel af sammenlignelig referencestandard blev EDAS sammenlignet med Barthel Index, som indeholder en kategori om hjælp til spisning, som del af daglig livets almindelige funktioner, dvs. at der testet for konvergens validitet.
2.2 Blev <i>testen</i> og referencestandarden vurderet uafhængigt (blindet) af hinanden?	Ja 3. Opfyldt i nogen grad Begge test blev udført på samme tid på 35 patienter af én bedømmer.
2.3 Blev patienter udvalgt til referencestandard uafhængigt af <i>testresultatet</i> ?	Ja 2. Opfyldt i tilstrækkelig grad
2.4 Blev såvel referencestandard som den diagnostiske test målt på alle patienter?	Ja 2. Opfyldt i tilstrækkelig grad
2.5 Blev referencestandard målt, før en intervention/behandling blev iværksat på baggrund af initiale <i>testresultater</i> ?	6. Ikke anvendeligt på den aktuelle artikel
2.6 Blev forskellige <i>test</i> sammenlignet i et validt design?	2. I den givne situation opfyldt i tilstrækkelig grad, idet 24 timers energi behov (slight scores 1-5), (moderat scores 6-10), og (severe scores 11-16) for hvert trin blev sammenlignet med referenceværdier for fødeindtag.
2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET	

2.1 I hvilken grad var undersøgelserne udført for at minimere risikoen for bias? <i>Anfør ++, + eller ÷.</i>	+
2.2 Hvis bedømt som + eller ÷, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet?	Alle målinger er udført af samme person.
2.3 Er undersøgelsens resultat direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe?	EDAS er uden tvivl et instrument, der giver detaljerede oplysninger om den hjælp, som en borger med apopleksi relaterede vanskeligheder med at spise har brug for. Problemet er, at det er meget omfattende, og vil næppe kunne anvendes af alle i plejegruppen. Der findes kun ganske få publicerede artikler, der beskriver brugbarheden af EDAS.
3. RESULTATER OG KOMMENTARER	
3.1 Var metoden der anvendtes til at vurdere testen i fht. referencestandardens tilstrækkelighed?	Da der ikke findes en gylden standard skønnes det at den anvendte metode er tilstrækkelig til vurdering af instrumentets validitet..