

Forfatter	År	Studietype	Studiets kvalitet	Befolkningstype	Intervention	Resultater (outcome)	Kommentarer
Westergren A. Minimal Eating observation form: Reliability and Validity The Journal of Nutrition Health & Aging.	2009	Diagnostisk test Minimal Eating observation form MEOF-II, er en kategorisk skala med 3 dimensioner af vanskeligheder med at spise og i alt 11 specifikke vanskeligheder med at spise, som er retningsgivende for handlinger.	+	Sample 1 50 patienter (30 mænd og 20 kvinder) indlagt konsekutivt på et apopleksiafsnit. Af disse havde 54 % brug for total eller delvis hjælp til spisning. Sample 2 I alt 2600 patienter (1726 fra kommunale institutioner og 874 fra hospitalsafdelinger) indgik i en undersøgelse, der havde til formål at kortlægge vanskeligheder med at spise hos patienter indlagt på hospital (874 patienter) og på 57 særlige rehabiliterende afdelinger i 6 kommuner (1726) beboere. Af de 2400 patienter var	Inter- rater reliabilitet Blev udført af en sygeplejerske og af 20 mindre uddannede observatører. Intern validitet af MEOF-II Der anvendes faktor analyse til vurdering af den interne validitet. Angives Chronbach's alfa værdier. Kriterievaliditet (ekstern validitet) Der anvendes logistisk regression til vurdering af sammenhængen mellem flere	Inter-rater reliabilitet Overensstemmelse mellem observatørerne på 89 %. Total Kappa værdi blandt: Uddannede 0.89. Utrænede 0.70 Intern validitet Chronbach's alfa for: Fødeindtagelse 0.63; Synkeprocessen: 0.66; Energi / appetit: 0.61. Alfa > 0.70 er god stabilitet Kriterievaliditet Der ses en statistisk signifikant sammenhæng	Inter-rater reliabilitet er god. Den interne validitet af MEOF- II er tilfredsstillende.

				444 apopleksi patienter. Gennemsnitsalder 80 år (SD 14.3).	eksterne kriterier (lavt BMI & væggtab og køn & alder) og instrumentets hovedområder.	mellem de to eksterne kriterier lavt BMI og væggtab og vanskeligheder med at spise 'energi og appetit' og 'synkeprocessen'. Derudover ses nogle komplicerede sammenhænge mellem de interne kriterier, som er vanskelige at tolke.	Der foreligger ikke gylden standard på området, det er derfor ikke muligt at testet for sensitivitet og specificitet. Generelt om MEOF-II: Det kan med en kort introduktion anvendes af alle involverede personalegrupper.
--	--	--	--	--	--	---	--