

Bilag 2: Søgeprotokol

Population	Børn under 3 år, men over 1 mdr., der har været i behandling med kontinuerlig infusion eller bolusindgift af opioider og/eller benzodiazepiner i forbindelse med hospitalsindlæggelse.
Index test	Udvikling og/eller validering af redskaber til vurdering af abstinenser
Reference standard	Almindelig praksis (eks. andre redskaber som NAS-Score, eller ikke-valideret metode)
Outcome	validerede, og derved mere præcise, målemetoder, der skaber mulighed for bedre vurdering og derved reducering af iatrogene abstinenser.

Søgeord:		
"Pediatric", "Child", "Pediatric Intensive Care", "Withdrawal", "Abstinence", "Opioid Weaning"		
Udvælgelseskriterier:		Database Søges fra
Inkludér	Ekskludér	- 2016
<p>Litteraturtyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metaanalyser • Systematisk litteraturgennemgang (systematisk review) • Interventionsstudier • Kohortestudier • Guidelines <p>Emner:</p> <p>abstinensvurdering</p> <p>Aftrapning af opioider/benzodiazepiner</p> <p>Udvikling og Validering af abstinensvurderingsredskaber</p>	<p>Emner:</p> <p>-Ophør af behandling</p> <p>-Palliativ behandling</p> <p>-Specifikke medicinundersøgelser</p> <p>-Single Case-reports</p> <p>Sprog:</p> <p>Andre sprog end engelsk, dansk, svensk og norsk</p> <p>Alder:</p> <p>(Under 1 måned)</p> <p>Over 18 år</p>	<p>Databaser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cochrane Library • EMBASE • PubMed • CINAHL <p>Desuden Trip, Sign, JBI, NICE, RNAO, Prospero</p> <p>Handsøgninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artiklernes referencelister

