

Bilag 5
Evidenstabeller af studier inkluderet på baggrund af checklister
Evidenstabeller omhandlende skift af grippernål i permanent central intravenøs port

Forfatter	År	Studietype	Studiets kvalitet	Befolkningstype	Intervention	Resultater (outcome)	Kommentarer
Vescia S et al.	2007	Oversigtsartikel. Litteratursøgningen er udelukkende foretaget i Medline.	+	De inkluderede studier omfatter 1938 patienter med permanent central intravenøs port.	Anlæggelse af permanent central intravenøs port. Behandling med Heparin til forebyggelse af trombose. Skift af grippernål i permanent central intravenøs port.	Steril procedure ved anlæggelse af permanent central intravenøs port kan mindske risikoen for infektion. Heparin kan ikke anbefales i forhold til daglig forebyggelse af trombose. Heparin kan anbefales hvis permanent central intravenøs port ikke bruges daglig. Ved klotting, trombose, anbefales det at give 5000 IU Heparin over 24 timer. Hver 3. måned skal	Litteratursøgningen er udelukkende foretaget i Medline. Der er kun søgt på engelsksprogede artikler. Risiko for publikationsbias. Sparsomt beskrevet metode. Anbefalingen vedr. skift af grippernål stemmer ikke overens med den nævnte kilde.

