

Bilag 10
Evidenstabeller af studier inkluderet på baggrund af checkliste
Evidenstabeller omhandlende metode til gennemskyning af centrale venekatetre og permanente centrale
intravenøse porte

Forfatter	År	Studietype	Studiets kvalitet	Befolknings-type	Intervention	Resultater (outcome)	Kommentarer
Bishop L et al.	2007	Evidensbaseret klinisk retningslinje	+	<p>Patienter med centralt kateter.</p> <p>Er ikke yderligere beskrevet.</p>	<p>Anlæggelse af centrale katetre.</p> <p>Håndtering af centrale katetre.</p> <p>Desinfektion</p> <p>Brugen af Heparin til forebyggelse af trombose</p> <p>Brugen af forbindelse</p>	<p>Anlæggelse bør foregå steril.</p> <p>Steril eller "non-touch" teknik skal bruges ved enhver håndtering af centrale katetre.</p> <p>Desinfektion bør gøres med klorhexidin 2%.</p> <p>Heparin er ikke mere effektiv end NaCl i forhold til forebyggelse af trombose ved centrale katetre, der bruges dagligt.</p> <p>Der ses dog undtagelser såsom, når kateteret ikke bruges dagligt og i forb. med dialyse.</p>	<p>Metode og litteratursøgning er ikke klart beskrevet.</p> <p>Artiklens evt. begrænsninger fremgår ikke.</p> <p>Kritik af de inkluderede studier fremgår ikke.</p> <p>Anbefalingerne fremgår tydeligt ud fra den fremstillede evidens.</p> <p>Anbefalingerne er ikke evidensgraderet.</p>

Cancer Care Ontario (CCO).	2006	Evidensbaseret klinisk retningslinje. Der er søgt i Medline, Embase, Cinahl og The Cochrane Library.	++	Børn og voksne patienter med et centralt kateter.	Hvorvidt centrale katetre skal lukkes med Heparin eller NaCl Hvilken volumen og mængde skal katetrene lukkes med Hvor ofte skal det skylles igennem	<p>Det anbefales at skylle CVK efter brug med 10ml NaCl +/- 5ml Heparin.</p> <p>Det anbefales at bruge positiv flush metoden ved lukning af CVK.</p> <p>Det anbefales at bruge gennemsigtig forbindelse, f.eks. OpSite IV3000 frem for gaze.</p> <p>Central intravenøs port skal lukkes med Heparin 100 IE/ml 5ml efter brug og min. hver 4 uge, hvis den ikke bruges.</p> <p>Lukkede tunneleerede katetre (CVK) skal lukkes med NaCl 0,9% 10ml efter brug og min. en gang om ugen hvis</p>	Omfattende litteratursøgning Børn indgår i studiet.
----------------------------	------	---	----	---	---	---	--

Cancer Care Ontario (CCO).	2006	Systematisk litteraturregennemgang Der er søgt i Medline, Embase, Cinahl og The Cochrane Library.	++	Børn og voksne patienter med et centralt kateter.	Hvorvidt centrale katetre skal lukkes med Heparin eller NaCl Hvilken volumen og mængde skal katetrene lukkes med Hvor ofte skal	den ikke er i brug. Åbne tunneleerede katetre (Hickman) skal lukkes med Heparin 100 IE/ml 3ml efter brug og min. en gang om ugen. Heparin er kontraindiceret hos patienter med Heparin induceret trombocytopeni. Der kan ikke laves anbefalinger vedr. positiv flush metoden.	Omfattende litteratursøgning Børn indgår i studiet.
----------------------------	------	--	----	---	---	--	--

