

Bilag 17a. Runde 1 og 2 resultater

| Vigtige risikofaktorer* for voksne og ældre | | | |
|--|--|----------------|-------------|
| PÅRØRENDE | Hvor vigtig en rolle spiller denne risikofaktor ? | | |
| | Lille | Moderat | Stor |
| Faktorer der har med den pårørendes person eller baggrund at gøre | | | |
| Den pårørende har en personlighedsforstyrrelse af moderat til svær grad | 10% | 70% | 20% |
| Den pårørende har tidligere lidt et eller flere tab | 0% | 57% | 43% |
| Den pårørende har tidligere haft en psykologisk lidelse (Fx depression eller angst) | 7% | 21% | 71% |
| Den pårørende har en ængstelig, undgående/usikker tilknytningsstil | 0% | 33% | 67% |
| Faktorer der har med relationen til den døende at gøre | | | |
| Den pårørende er ægtefælle/partner eller forælder til den døende | 0% | 58% | 42% |
| Den pårørende er meget afhængig af sin ægtefælle som er døende | 0% | 50% | 50% |
| Faktorer der har med social støtte at gøre | | | |
| Den pårørende oplever ikke at få tilstrækkelig social støtte | 15% | 31% | 54% |
| Den pårørende er utilfreds med sin sociale støtte | 17% | 42% | 42% |
| EFTERLADTE | | | |
| Faktorer der har med dødsfaldet at gøre | | | |
| Dødsårsagen var mord | 0% | 45% | 55% |
| Den efterladte var til stede og i livsfare, men overlevede ulykken/situationen der forårsagede dødsfaldet | 0% | 60% | 40% |
| Dødsfaldet var voldsomt | 8% | 38% | 54% |
| Dødsfaldet skete pludseligt/var uventet | 9% | 64% | 27% |
| Dødsfaldet var voldsomt, og den efterladte fandt den afdøde | 8% | 17% | 75% |
| Den efterladte mener, at dødsfaldet kunne have været forebygget | 17% | 67% | 17% |
| Faktorer der har med den efterlattes person eller baggrund at gøre | | | |
| Den efterladte har tidligere lidt et eller flere tab | 0% | 57% | 43% |
| Den efterladte har en personlighedsforstyrrelse af moderat til svær grad | 10% | 70% | 20% |
| Den efterladte har tidligere haft en psykologisk lidelse (Fx depression eller angst) | 7% | 21% | 71% |
| Den efterladte har en ængstelig, undgående/usikker tilknytningsstil | 0% | 33% | 67% |
| Faktorer der har med den efterlattes sorgreaktion at gøre | | | |
| Den efterladte oplever stærke symptomer på depression | 0% | 55% | 45% |
| Den efterladte påtager sig skylden for dødsfaldet | 0% | 50% | 50% |
| Den efterladte har stærke post traumatiske reaktioner (så som uønskede/ubehagelige påtrængende billeder af den afdøde) | 10% | 30% | 60% |
| Faktorer der har med relationen til afdøde at gøre | | | |
| Den efterladte var ægtefælle/partner eller forælder til afdøde | 0% | 58% | 42% |
| Den efterladte var meget afhængig af sin nu afdøde ægtefælle | 0% | 50% | 50% |
| Faktorer der har med social støtte at gøre | | | |
| Den efterladte oplever ikke at få tilstrækkelig social støtte | 15% | 31% | 54% |
| Den efterladte er utilfreds med sin sociale støtte | 17% | 42% | 42% |

* mindst 80% af respondenterne har vurderet at de er vigtige

