

**Bilag 8. Evidenstabeller over inkluderede studier med forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge pårørende til en nærtstående person hvor kurativ behandling ikke er mulig**

Forfatter	År	Studiotype	Studiets kvalitet	Befolkningstype	Intervention	Resultater	Kommentarer
Christ et.al.	2005	RCT	Poor quality	184 familier, der havde mindst et barn i alderen syv-17 år og hvor den ene af forældrene har kræft blev randomiseret til at modtage forælderådgivning (intervention) eller telefon-opfølgning (kontrol).	Forælderådgivning interventionen bestod af at den raske forælder modtog psykosocial støtte med fokus på hvad denne kunne gøre for at give barnet/børnene de bedste muligheder for sund tilpasning og sorgproces. Derudover støtte og hjælp til forældrenes egen sorgproces. Interventionen varede 12 måneder og bestod af seks samtaler på 60-90 minutter under sygdomsforløb og seks efter dødsfald. Sammenligningsinterventionen bestod af opfølgende telefonsamtaler med formål at tilbyde familier tilbud og støtte til familier i samme	Ingen signifikant forskel på depression Ingen signifikant forskel på angst Ingen signifikant forskel i social kompetence	Der var en trend hen imod en større nedgang i angst hos gruppen der fik forælderådgivning. Børnene havde forholdsvis lavt niveau af psykopatologi til at begynde med, hvilket kan begrænse en signifikant forskel i målingerne. Måleinstrumenterne har muligvis ikke været sensitive nok til at indfange sorgsymptomer. Desuden har telefon-opfølgning for kontrolgruppen muligvis fungeret som en slags intervention.

Forfatter	År	Studietype	Studiets kvalitet	Befolkningstype	Intervention	Resultater	Kommentarer
					situation. Familierne blev kontaktet telefonisk hver fjerde til ottende uge med henblik på at holde kontakten ved lige. Telefonsamtalerne varede 30 minutter.		