

**Bilag 8. Evidenstabeller over inkluderede studier med forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge pårørende til en nærtstående person hvor kurativ behandling ikke er mulig**

Forfatter	År	Studietype	Studiets kvalitet	Befolkningstype	Intervention	Resultater	Kommentarer
Christ et.al.	2005	RCT	Poor quality	184 familier, der havde mindst et barn i alderen syv-17 år og hvor den ene af forældrene har kræft blev randomiseret til at modtage forælderådgivning (intervention) eller telefon-opfølgning (kontrol).	Forælderådgivning interventionen bestod af at den raske forælder modtog psykosocial støtte med fokus på hvad denne kunne gøre for at give barnet/børnene de bedste muligheder for sund tilpasning- og sorgproces. Derudover støtte og hjælp til forældrenes egen sorgproces. Interventionen varede 12 måneder og bestod af seks samtaler på 60-90 minutter under sygsomdforløb og seks efter dødsfald. Sammenligningsinterventionen bestod af opfølgende telefonsamtaler med formål at tilbyde familier tilbud og støtte til familier i samme	Ingen signifikant forskel på depression Ingen signifikant forskel på angst Ingen signifikant forskel i social kompetence	Der var en trend hen imod en større nedgang i angst hos gruppen der fik forælderådgivning. Børnene havde forholdsvis lavt niveau af psykopatologi til at begynde med, hvilket kan begrænse en signifikant forskel i målingerne. Måleinstrumenterne har muligvis ikke været sensitive nok til at indfange sorgsymptomer. Desuden har telefon-opfølgning for kontrolgruppen muligvis fungeret som en slags intervention.

<b>Forfatter</b>	<b>År</b>	<b>Studietype</b>	<b>Studiets kvalitet</b>	<b>Befolkningstype</b>	<b>Intervention</b>	<b>Resultater</b>	<b>Kommentarer</b>
					situation. Familiene blev kontaktet telefonisk hver fjerde til ottende uge med henblik på at holde kontakten ved lige. Telefonsamtalerne varede 30 minutter.		